

1°anno di vita:

- Esavalente + Pneumococco + Rotavirus ad inizio 3° mese di vita (61° giorno di vita)
- Meningococco B dopo 15 giorni (76° giorno)
- Meningococco B dopo un mese (106° giorno)
- Esavalente + Pneumococco + Rotavirus ad inizio 5° mese di vita (121° giorno di vita)
- Meningococco B dopo 1 mese (151° giorno)
- Esavalente + Pneumococco a 11 mesi compiuti.

2°anno di vita:

- MPRV dal 13° mese di vita (MPRV o MPR+V); nei casi in cui si è in presenza di un focolaio epidemico la vaccinazione anti MPR può essere anticipata già a partire dal nono mese di vita, come peraltro riportano nella nota circolare prot. n° 948 del 27 aprile 2010.
- a partire dal 14° mese
- Meningococco B dal 15° mese (dopo un mese dalla somministrazione di Meningococco ACW135Y).

6° anno di vita:

- Difterite-Tetano-Pertosse-Polio (DTPa-IPV)
- MPRV o MPR + Varicella (anche in co-somministrazione con il DTPa-IPV).

12° anno di vita:

- Papilloma virus nono-valente
- Meningococco ACW135Y (esteso fino al 30 anno di vita)
- Meningococco B (soggetti mai vaccinati – schedula a due dosi distanziati da almeno 30 giorni)
- MPRV oppure MPR + Varicella (recupero suscettibili).

14°- 18° anno di vita :

- Difterite-Tetano-Pertosse-Polio (dTpa-IPV)
- MPRV (recupero suscettibili)
- Pneumococco 13 valente – Pneumococco 23 Valente; per tutti i soggetti a rischio: somministrazione del PCV 13 seguito, in via ordinaria dopo un anno, (in casi particolari può essere anticipata dopo tre mesi) dal PPV 23.

Età adulta (19-64 anni):

- Difterite-Tetano-Pertosse (dTpa) ogni 10 anni
- MPRV oppure MPR + Varicella (recupero suscettibili)
- Meningococco ACW135Y (in situazioni epidemiologiche di rischio)
- Vaccinazioni e gravidanza (Strategia COOCON)
- Pneumococco 13 valente – Pneumococco 23 Valente; per tutti i soggetti a rischio: somministrazione del PCV 13 seguito, in via ordinaria dopo un anno, (in casi particolari può essere anticipata dopo tre mesi) dal PPV 23.

Età adulta (>64 anni):

- Influenza (annuale)
- Pneumococco 13 valente – Pneumococco 23 Valente; per le coorti al 60° ed al 65 anno, (chiamata attiva) somministrazione del PCV 13 seguito, in via ordinaria dopo un anno, (in casi particolari può essere anticipata dopo tre mesi) dal PPV 23.
- Herpes Zoster coorte 65 - 75 anni.

REGIONE SICILIA - " CALENDARIO VACCINALE PER LA VITA" Integrato e Modificato a recepimento del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017 - 2019																			
Vaccino	Nascita	3° mese (dal 61° giorno)	77° giorno di vita, dopo 15 giorni dalla somministrazione e di esa + PCV 13 e Rota	5° mese	137° giorno di vita, dopo 15 giorni dalla somministrazione di esa + PCV 13 e Rota	168° giorno di vita , dopo un mese dalla seconda dose di Men B	11°-12° mese	13°-15° mese	15/18 mesi 1 mese dopo la somministrazione di MPRV	5° - 6° anno	12° anno	14°-18° anni	19°-30° anni	19-64 anni	Coorte al 65° anno	50 - 65 anni	Coorte dal 65° al 75° anno	≥ 65 anni	
DTPa		DTPa		DTPa			DTPa												
IPV		IPV		IPV			IPV												
Epatite B	HBV	HBV		HBV			HBV												
Hib		Hib		Hib			Hib												
PCV13		PCV13		PCV13			PCV13												
Rotavirus		1 dose		2 dose															
Anti Meningo B			1° dose Men B		2° dose Men B	3° dose Men B			4° dose Men B		Men B - Soggetti mai Vaccinati N° due dosi distanziate di almeno 30 giorni								
Meningo ACW135Y coniugato								Men. ACW135Y			Men. ACW135Y								
MPR + Varicella								MPRV/ MPR + Var			MPRV/ MPR + Var - Recupero suscettibili								
dTpa																			
DTPa + IPV									DTPa + IPV/ DTPaIPV										
dTpa + IPV												dTpa+ IPV/ dTpaIPV							
HPV											HPV		→ 45 anni (F)						
													→ 26 anni (M)						
Anti-Influenzale											Influenza								
Anti-Pneumococcico												PCV13/PPV23 Pazienti a rischio per patologia						PCV13/ PPV23	
Anti Zoster																		Zoster pazienti a rischio	Zoster

DTPa : diftetanopertosse acellulare ; **dTpa**: diftetanopertosse acellulare adulti; **IPV**: antipolio Salk ; **HBV**: epatite B **Hib**: emofilo;
PCV13: pneumo 13 valente coniugato; **PPV 23**: anti pneumo 23 valente polisaccaridico; **Var**: varicella; **MPR**: anti morbillo-parotite-rosolia;
MPRV: anti morbillo-parotite-rosolia-varicella; **HPV**: anti papillomavirus nono-valente; **Men ACW135Y**: meningococco Tetravalente coniugato;
Men B: antimeningite B;